



**InfoNEURO**

Institut et Hôpital neurologiques de Montréal  
INFORMATIONS POUR LES PATIENTS

# Traitement chirurgical de l'épilepsie

## Comprendre vos soins



Préparé par Patricia Kerr, B.Sc.Inf., CSN(C), Sheila Koutsogiannopoulos, B.Sc.Inf., CSN(C), Naomi Akazawa, B.Sc. Inf., du Programme en épilepsie du CUSM et Eileen Beany Peterson, MBSI. Révée par Dr A. Olivier et Dr J. Hall, Neurochirurgie.

Réalisé par le Centre d'information pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, 2006



Centre universitaire de santé McGill  
McGill University Health Centre

## **Pourquoi dois-je avoir maintenant un traitement chirurgical de l'épilepsie?**

- Vos crises ne sont pas maîtrisées avec les médicaments anticonvulsifs.
- Vos médecins ont réussi à trouver l'endroit dans votre cerveau d'où proviennent vos crises.


## **Cette chirurgie peut-elle causer des problèmes?**

Comme c'est le cas pour toute chirurgie au cerveau, il existe un petit risque que ces problèmes se produisent :

- De l'infection
- Des saignements
- De la faiblesse dans une partie de votre corps

## **Que se passera-t-il le jour de ma chirurgie?**

On vous amènera en civière à la salle d'opération où vous rencontrerez les infirmiers(ères) et les médecins de la salle d'opération. Depuis le moment où on ira vous chercher dans votre chambre d'hôpital jusqu'au moment où on vous amènera à la salle de réveil, la procédure peut prendre environ de 6 à 8 heures. La chirurgie sera faite sous anesthésie générale. Vous aurez un petit pansement à la tête, qui sera enlevé après quelques jours.



## **Mes cheveux devront-ils être rasés?**

Oui. Votre médecin décidera quelle quantité de cheveux devra être rasée. Vos cheveux repousseront rapidement et cacheront la cicatrice.

## **Comment me sentirai-je après la chirurgie?**

- Vous aurez peut-être : de l'enflure aux yeux et au visage, des maux de tête, des nausées, de la douleur.
- Les crises pourraient continuer pendant les quelques premiers jours suivant la chirurgie. Ceci n'est pas inhabituel.
- Vous aurez peut-être de la douleur en mâchant et en ouvrant la bouche.

Dans ce cas, demandez à votre infirmier(ère) des médicaments qui soulageront la douleur.

Vous devriez vous sentir beaucoup mieux le 3<sup>e</sup> et être prêt(e) à rentrer à la maison le 4<sup>e</sup> jour.

## **Que se passera-t-il pour mes crises?**

Les crises pourraient continuer pendant les quelques premiers jours suivant la chirurgie. Ceci n'est pas inhabituel.

## Que devrai-je faire une fois rentré(e) à la maison?

- Une fois à la maison, n'en faites pas trop et dormez beaucoup.
- Demandez à un(e) ami(e) ou à un proche de venir vous aider pendant quelques jours.
- Vos points de suture seront enlevés dans 7 à 10 jours. Ceci peut être fait par votre C.L.S.C., votre clinique locale ou votre médecin de famille.
- Ne faites pas les choses qui ont provoqué vos crises dans le passé.



- Attendez de 4 à 6 semaines avant de retourner au travail, à l'école ou de faire des activités qui demandent de l'effort.
- Il est très important de continuer à prendre vos médicaments anticonvulsifs prescrits par votre médecin.

## Comment seront mes émotions?

Certains trouvent que leurs émotions vont dans tous les sens durant les premières semaines après la chirurgie. Peut-être vous allez avoir le cafard ou vous sentir déprimé(e) pour ensuite vous sentir excité(e) ou transporté(e) de joie. Ces sentiments sont temporaires mais il est possible que vous deviez prendre des médicaments pour ceci pendant une courte période de temps.

Le rétablissement après la chirurgie est différent d'une personne à l'autre. Vos médecins, infirmiers(ères) et travailleur(se) social(e) sont disponibles pour vous donner du soutien et répondre à vos questions.

## Quand dois-je revoir mon médecin?

Des rendez-vous de suivi seront pris régulièrement avec vos médecins. Il est important de se rendre à ces rendez-vous. Le médecin voudra voir comment vont votre guérison et votre cicatrisation, et si la chirurgie a diminué vos crises.

### **Appelez immédiatement votre chirurgien(ne) si :**

Tél: \_\_\_\_\_

- **Vos maux de tête augmentent**
- **Vous avez de la fièvre ou de la raideur au cou**
- **Votre plaie devient rouge, enflée, douloureuse ou un liquide commence à suinter de votre plaie.**



Si vous êtes dans l'impossibilité de rejoindre votre chirurgien(ne) ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler l'infirmier(ère) clinicien(ne) du programme en épilepsie au (514) 398-5797.