



## 更多的重要信息

- 在治疗潜伏性结核感染期间，请避免饮酒，因为饮酒会增加药物副作用发生的风险
- 服用利福平会降低激素类避孕药的避孕效果。如果您正在服用该类避孕药，请考虑使用其它方式避孕
- 如果您持有有效的魁北克医疗保险卡（RAMQ），该药物将免费提供
- **就诊时请携带您所有剩余的潜伏性结核治疗药物。**



## 如遇到紧急情况，请到以下地址就诊

麦吉尔大学医学中心  
Site Glen, Bloc D, RC.3314  
周一至周五 上午 8:30 至下午 4:00

或

麦吉尔大学医学中心皇家维多利亚医院  
(RVH) 急诊室  
晚上，夜间，周末和节假日开放  
每周7天24小时开放

## 我们一直致力于让您保持健康！

如果您有更多问题或疑虑，请拨打以下电话：  
(514) 934-1934 转 32591

请浏览以下页面获取更多信息：

[www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/tuberculose](http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/tuberculose)  
MAN\_02.2019

Centre universitaire  
de santé McGill



McGill University  
Health Centre

## 蒙特利尔胸科医院

地址：麦吉尔大学医学中心  
Site Glen, bloc D, RC.3314 (一层)  
1001, boul. Décarie, Montréal, QC, H3A 3J1  
电话：(514) 934-1934 转 32591  
(如无人接听，请在留言信箱留言)

病历编号： \_\_\_\_\_

医生： \_\_\_\_\_

护士： AMÉLIE - DENIS - OCTAVIAN - \_\_\_\_\_

# 预防性治疗潜伏性肺结核感染

## 潜伏性结核感染与活动性结核病的区别：

**潜伏性结核感染（休眠的/病菌携带者）有以下主要特征：**

- 无发病症状
- 无传染性（不会传染给他人）

但是，潜伏性结核感染有发展为活动性结核病的可能，因此我们需要对它进行治疗。

**活动性结核病有以下主要特征：**

- 有生病症状
- 具有传染性（结核杆菌会传染给他人）
- X光胸片异常

一些活动性结核病人的肺部会留下永久性疤痕和损伤



## 治疗潜伏性结核感染的好处：

- 防止它发展为活动性肺结核
- 治疗过程通常具有良好的耐受性和安全性

通过治疗，将会降低今后您患上活动性结核病的风险，从而保护您和您的家人朋友的健康。

## 治疗潜伏性结核感染期间的跟踪与监测：

- 治疗一个月之后进行血液检查，然后由医生决定接下来的检查时间
- 医生和护士的定期回访



## 对潜伏性结核感染的治疗有助于保护您的健康

对读者的重要提示：  
本文档旨在提供教育信息，而非取代专业医疗从业人员的建议指导或代替医学治疗。如有您有任何相关问题，请咨询有从业资格的医务人员。



药物：\_\_\_\_\_

剂量：\_\_\_\_\_

治疗起始时间：\_\_\_\_\_

治疗疗程：\_\_\_\_\_

服药时间：起床 / 睡前 / 在 \_\_\_\_\_

治疗药物可以在适合您的时间服用，一天一次，是否与食物一同服用均可。为了更好的吸收，建议最好在餐前1小时或餐后2小时服用。

## 副作用：

服用该药物时**很少**发生副作用。如果您对身体症状有任何疑虑或担忧，请致电我们或前来就诊。**特别是如果您有以下症状：**

- 食欲不振
- 恶心
- 呕吐
- 皮疹或皮肤瘙痒
- 眼睛或皮肤发黄变色

让您担忧的任何症状都应及时报告给您的护士

如果您正在服用抗生素利福平，您的分泌物（如尿液，眼泪等）可能会呈**橙色**。这种症状是正常的和暂时的。