



TUBERCULOSE LATENTE



**UMA EM CADA
10 PESSOAS QUE
NÃO TRATARAM
A TUBERCULOSE
LATENTE TERÃO
A DOENÇA.**

O QUE TUBERCULOSE LATENTE?

É quando uma pessoa está infectada com a bactéria da tuberculose, mas ainda não tem a doença. As pessoas com tuberculose latente não têm sintomas, não se sentem doentes e não podem infectar os outros. Mas no futuro podem adoecer por tuberculose.



Quem deve ser testado para tuberculose latente?

Todas as pessoas que tiveram contato próximo com alguém doente por tuberculose.


Como eu descubro se eu tenho tuberculose latente?

É simples, basta fazer a **prova tuberculínica**. Este é um teste em que um pouco de líquido é injetado na pele do seu antebraço com uma agulha muito fina e pequena. Um profissional de saúde treinado vai aplicar a injeção e você deverá voltar à unidade de saúde 2 ou 3 dias depois para ter o resultado do exame.

A prova tuberculínica é oferecida gratuitamente em grande parte das unidades básicas de saúde.

Por que as pessoas precisam tratar a tuberculose latente?

Sem tratamento, a **tuberculose latente pode progredir para a tuberculose doença**. Se isto acontecer, você terá sintomas como tosse, febre, falta de apetite e perda de peso. Você também poderá espalhar a bactéria da tuberculose para outras pessoas nesta fase. **O tratamento com antibiótico é a forma mais eficaz de prevenir que uma pessoa com a tuberculose latente tenha a doença.**



Como é o tratamento?

O recomendado é usar um antibiótico durante alguns meses, com acompanhamento médico. O melhor tratamento será decidido pelo seu médico após conversar com você.

Quais os efeitos colaterais do tratamento?

Os medicamentos usados para tratar a tuberculose latente podem causar efeitos colaterais, como em qualquer outro tratamento. No entanto, apenas um antibiótico é usado e o risco destes efeitos é baixo.

Enquanto estiver sendo tratado, é importante evitar bebidas alcoólicas e evitar usar medicamentos como paracetamol. Essas substâncias podem sobrecarregar o seu fígado. Se você tiver dor abdominal, náuseas e outras reações, entre em contato com o médico ou enfermeiro

Por que é necessário tomar a medicação regularmente?

As bactérias da tuberculose são mortas muito lentamente. É importante tomar o antibiótico regularmente para garantir que todas as bactérias sejam mortas.



Dicas para não esquecer de tomar a medicação:

Aqui estão algumas maneiras de lembrar de tomar o remédio regularmente:

- Tome os comprimidos todos os dias na mesma hora;
- Deixe os comprimidos sempre no mesmo lugar (por exemplo, com sua escova de dentes);
- Marque em um calendário os dias em que tomou o remédio;
- Coloque um alarme no celular para lembrar de tomar as medicações;
- Peça a um familiar ou amigo para te lembrar de tomar seu remédio;
- Informe o seu médico ou enfermeiro quando o remédio estiver acabando;
- Não falte a nenhuma consulta agendada.

Informações de contato:

Se você teve contato com alguém doente com tuberculose, procure o setor de tuberculose dessa clínica ou o agente comunitário da sua área para ser avaliado para tuberculose latente.