



Información adicional importante

- El consumo de alcohol durante su tratamiento deberá ser evitado ya que puede aumentar el riesgo de tener efectos secundarios.
- Rifampicina puede hacer que no funcione bien la píldora anticonceptiva (anticonceptivo hormonal). Si usted está tomando este medicamento, deberá utilizar otro método anticonceptivo durante su tratamiento.
- Este medicamento es gratuito si cuenta con una tarjeta de seguro de salud de Quebec válida (RAMQ).
- **Por favor traiga todo su tratamiento contra la Tuberculosis latente en cada visita.**



En caso de emergencia

Vaya a

Bloc D, RC.3314

Lunes a viernes de 8:30 am a 4:00 pm

O AL

Hospital Glen RVH Sala de emergencias,
TARDES, NOCHES, MADRUGADAS, FINES DE
SEMANA Y DÍAS FERIADOS

Abierto 24 horas al día 7 días a la semana

¡Estamos aquí para ayudarle a estar en buena salud!

¿Tiene preguntas o preocupaciones?

¡Llámenos! (514) 934-1934 extensión: 32591

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA EL SIGUIENTE SITIO WEB:

<https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/tbinfectiondisease.htm>
www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis

SPA_02.2019

Centre universitaire
de santé McGill



McGill University
Health Centre

Instituto Torácico de Montreal

Hospital Glen, bloque D, RC.3314 (planta baja)
1001, boul. Décarie, Montréal, Qc, H3A 3J1

Tel: (514) 934-1934 extensión: 32591

(dejar un mensaje en el contestador automático)

ARCHIVO : _____

DOCTOR : _____

ENFERMERA(O): AMÉLIE – DENIS – OCTAVIAN – _____


Tratamiento preventivo de Tuberculosis Latente

¿Cuál es la diferencia entre Tuberculosis activa y Tuberculosis latente?

TUBERCULOSIS LATENTE (portador/inactiva) está asociada con

- No estar enfermo.
- No ser contagioso (no puede transmitir la enfermedad).

PERO si puede convertirse en Activa en el futuro, es por eso que damos tratamiento para la forma latente.



TUBERCULOSIS ACTIVA está asociada con

- Estar enfermo.
- Ser contagioso (transmitir la enfermedad a otras personas).
- Una radiografía de tórax anormal.

En algunos casos la Tuberculosis activa puede dejar cicatrices permanentes y daño en el pulmón.



Tratamiento para tuberculosis latente

- Va a prevenir que tenga la Tuberculosis Activa en el futuro.
- Generalmente es bien tolerado y seguro.

Al tomar su tratamiento, está incrementando sus posibilidades de prevenir el desarrollo de Tuberculosis Activa en el futuro. Está protegiendo su salud, la de su familia y amigos.

Seguimiento durante el tratamiento para la Tuberculosis latente

- Pruebas de sangre después de un mes y posteriormente cuando su médico lo indique.
- Visitas programadas con su médico y enfermera.



 El tratamiento para tuberculosis latente protege su salud

Información importante para el lector

La información de este documento es con fines educativos. No reemplaza las indicaciones de un profesional de la salud, ni tampoco es un sustituto de un servicio médico. Por favor hable con un profesional de la salud si tiene preguntas acerca del cuidado de su salud.

Centre universitaire
de santé McGill



McGill University
Health Centre

MEDICAMENTO: RIFAMPICINA (RIF): _____

DOSIS: _____

FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO: _____

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: _____

CUÁNDO TOMAR EL MEDICAMENTO:
AL DESPERTAR/ ANTES DE DORMIR / A LAS _____

Tome el medicamento en el horario que más le convenga, con o sin comida, **una vez al día**. Para mejor absorción, tome el medicamento 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer.

Efectos secundarios:

Es **raro** que aparezcan efectos secundarios por este medicamento. Si tiene alguna preocupación acerca de alguno de estos síntomas, **por favor llame o venga a vernos**, especialmente si tiene:

- Pérdida de apetito
- Náusea
- Vómito
- Erupciones de la piel o Irritación en la piel
- Coloración amarilla de la piel o los ojos

Todo síntoma que le preocupa debe ser informado a la enfermera.

Sus secreciones (orina, lágrimas, etc) pueden cambiar a un color **naranja** si está tomando el antibiótico Rifampicina. Esto es normal y no es permanente.