



### Các thông tin quan trọng khác

- Nên **tránh** uống rượu bia trong thời gian điều trị vì rượu bia làm tăng khả năng xuất hiện các phản ứng phụ.
- Rifampin có thể làm giảm tác dụng viên thuốc tránh thai (từ nội tiết tố). Nếu bạn đang dùng loại này, bạn cần sử dụng thêm phương pháp tránh thai khác khi điều trị lao tiềm ẩn.
- Thuốc này được cấp miễn phí nếu bạn có thẻ Bảo hiểm y tế Québec (RAMQ).
- **Vui lòng mang tất cả các thuốc điều trị lao tiềm ẩn mà bạn còn giữ mỗi khi đến tái khám.**



### Trường hợp khẩn cấp

Hãy đến  
Bloc D, RC.3314  
Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 4:00  
chiều

Hoặc:

đến phòng cấp cứu The Glen Site RVH  
Mở cửa 24 giờ/ngày, trong 7 ngày/tuần

### Chúng tôi ở đây để giúp bạn được khoẻ mạnh!

**Nếu bạn quan tâm hoặc có thắc mắc, gọi cho chúng tôi ở số  
(514) 934-1934, tiếp theo: 32591**

**Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại trang web:**  
[www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis](http://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis)

VIE\_02.2019

Centre universitaire  
de santé McGill



McGill University  
Health Centre

### Montreal Chest Institute

Glen Site, block D, RC.3314 (tầng trệt)  
1001, Boulevard Décarie, Montréal, Qc, H3A 3J1

**Điện thoại : (514) 934-1934 extension: 32591**  
(Có thể để lại tin nhắn qua voicemail)

BỆNH NHÂN : \_\_\_\_\_

BÁC SĨ: \_\_\_\_\_

Y TÁ : AMÉLIE – DENIS – OCTAVIAN \_\_\_\_\_


# Điều Trị Lao Tiềm Ẩn

## Khác biệt giữa bệnh lao tiến triển và lao tiềm ẩn

**Lao tiềm ẩn (vi trùng ở trạng thái ngủ: trong người mang vi trùng) được thể hiện:**

- Không có dấu hiệu bệnh.
- Không truyền nhiễm (không thể lây lan bệnh cho người khác).

NHƯNG nó có thể trở thành bệnh lao tiến triển trong tương lai, do đó cần phải điều trị dự phòng.



**Lao tiến triển có biểu hiện:**

- Có triệu chứng bệnh
- Truyền nhiễm (lây lan bệnh lao cho người khác).
- Có hình ảnh bất thường trên X-Q của ngực.

Trong một số trường hợp, lao tiến triển có thể để lại sẹo và thương tích vĩnh viễn ở phổi.



### Điều trị lao tiềm ẩn

- Giúp bạn ngăn ngừa mắc bệnh lao tiến triển trong tương lai
- Nói chung thuốc trị bệnh ngừa tốt và an toàn

Điều trị lao tiềm ẩn giúp tăng cơ hội ngăn bệnh lao tiến triển xảy ra trong tương lai. Vừa giúp, bạn bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, cho gia đình và cho bạn bè của mình.

### Theo dõi trong quá trình điều trị lao tiềm ẩn

- Xét nghiệm máu sau 1 tháng điều trị hoặc theo chỉ định của bác sĩ
- Tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc y tá

Nhiễm

Xét nghiệm

Điều trị

Khoẻ mạnh

**Điều trị lao tiềm ẩn sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn**

### Thông tin quan trọng đối với người đọc

Thông tin trong tài liệu này nhằm mục đích giáo dục sức khỏe. Thông tin này không thay thế lời khuyên và hướng dẫn của cán bộ y tế, và cũng không thay thế cho việc chăm sóc y tế. Vui lòng thảo luận với một cán bộ y tế chuyên nghiệp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình.

Centre universitaire  
de santé McGill



McGill University  
Health Centre

THUỐC ĐIỀU TRỊ: RIFAMPIN (RIF) \_\_\_\_\_

LIỀU LƯỢNG: \_\_\_\_\_

Ngày bắt đầu điều trị: \_\_\_\_\_

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ: \_\_\_\_\_

UỐNG THUỐC LÚC:  
SÁNG SỚM/ TRƯỚC KHI NGỦ LÚC: \_\_\_\_\_

Uống thuốc vào thời gian thuận tiện nhất của bạn, trước hoặc sau khi ăn, **ngày một lần**. Tuy nhiên để thuốc được hấp thu tốt vào cơ thể, bạn nên uống thuốc 1 tiếng đồng hồ trước hoặc 2 tiếng đồng hồ sau bữa ăn.

### Các phản ứng phụ:

Phản ứng Rất hiếm khi xảy ra phụ khi dùng thuốc này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo lắng nào, **vui lòng gọi hoặc đến gặp chúng tôi**, đặc biệt khi bạn gặp phải:

- Giảm cân hoặc mất ngon miệng
- Buồn nôn
- Nôn mửa
- Da nổi mẩn đỏ hoặc ngứa
- Vàng da – vàng mắt

Bất kỳ triệu chứng bạn lo lắng nên xin báo cáo với y tá

Các chất bài tiết của bạn (nước tiểu, nước mắt...) có thể có màu **cam** nếu như bạn được chỉ định dùng Rifampin. Hiện tượng này là bình thường và không tồn tại lâu.